

Darmdekontamination (Kontrolle)

Allgemeine Hinweise

Bei dieser Untersuchung wird im Gegensatz zur Stuhluntersuchung auf darmpathogene Keime die Stuhlprobe auf nicht bzw. wenig selektive Kulturmedien aufgebracht, die das Wachstum der normalen Stuhlflora erlauben. Dies ist **nur dann sinnvoll**, wenn davon auszugehen ist, dass durch eine voran gegangene **selektive Darmdekontamination** die aerobe/fakultativ anaerobe Stuhlflora bis auf Ausnahmen (Enterokokken, Koagulase-negative Staphylokokken) eliminiert wurde und dient der Erfolgskontrolle. Die Anaerobierflora sollte weitgehend erhalten bleiben.

Bei Nachweis von *Staphylococcus aureus*, Enterobakteriazeen oder anderen aeroben gramnegativen Stäbchenbakterien (z.B. *Pseudomonas aeruginosa*) werden diese differenziert und eine Resistenzbestimmung durchgeführt. Ebenso erfolgt die Angabe von *Clostridium difficile* sowie die Angabe und Speziesbestimmung von Sprosspilzen.

Anforderung an das Untersuchungsmaterial

Stuhlprobe

Termine

Während der regulären Dienstzeit

Durchschnittliche Bearbeitungsdauer

2-3 Tage

Telefonische Befundmitteilung

Nur wenn gewünscht und auf dem Einsendeschein vermerkt.

Bemerkungen
